

Алатар

«Алатар» — универсальный препарат для защиты садово-огородных культур от вредителей.

«Алатар» уничтожает 29 видов садовых и огородных вредителей! «Алатар» эффективен против **плодожорок, белянок, совок, листоверток, тлей, медяницы, белокрылок, долгоносиков, листоблошек, луковой и морковной мухи, яблонной и других молей** и других насекомых.

«Алатар» защитит от вредителей большинство садовых и огородных культур на Вашем участке (**капусту, лук, морковь, огурцы, томаты, яблоню, грушу, смородину, крыжовник, землянику, малину, цветы, декоративные кустарники** и т.д.)

"Алатар" - обязательное средство неотложной помощи от вредителей в "аптечке" садовода и огородника!

Препарат обладает "**нокдаун-эффектом**": после обработки "Алатаром" вредители практически сразу же перестают питаться и двигаться, и через очень короткое время погибают.

Препарат имеет малую норму расхода — всего 5 мл/10 л воды на 1 сотку. В вашей садовой аптечке «Алатар» должен быть обязательно как первое средство неотложной помощи при неожиданном нападении вредителей.

Состав и препаративная форма "Алатара"

Состав: малатион — 22,5%, циперметрин — 5,0%, ПАВ, антиоксидант, стабилизатор, растворитель.

«Алатар» наносит по вредителям двойной удар, так как содержит сразу два действующих вещества: **малатион и циперметрин**. Он успешно подавляет даже устойчивые популяции вредителей и обладает синергическим эффектом.

Входящий в его состав прилипатель препятствует скатыванию раствора с листьев и смыванию дождем, удлинит период защитного действия.

Срок годности: 2 года.

Меры безопасности

При работе соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, принимать пищу.

Обработку помещений проводят при открытых форточках (окнах) в отсутствие домашних животных. Не обрабатывать внутреннюю поверхность шкафов или других мест хранения продуктов или посуды. После обработки хорошо вымыть руки и лицо водой с мылом.

При попадании на кожу — удалить препарат, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом. При вдыхании препарата — вывести пострадавшего на свежий воздух.

При попадании препарата в глаза — промыть струей чистой проточной воды. При попадании препарата через рот — тщательно прополоскать рот водой, выпить несколько стаканов теплой воды с взвесью активированного угля (1 г на 1 кг массы тела), а затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту.

После оказания первой помощи необходимо обратиться к врачу. Специфического антидота нет. Лечение симптоматическое. В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре, тел. (495) 628-16-87.

Не использовать освободившуюся тару для других целей. Не выбрасывать освободившуюся тару в канализацию, реки или другие водоемы.

Хранение и срок годности препарата

Хранить при температуре от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$, отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов животных, в сухом, прохладном, затемненном помещении, недоступном для детей и домашних животных. Использовать только по назначению. Беречь от огня!

Применение: опрыскивание растений в период вегетации.

| Норма применения | Культура | Вредители | Расход рабочей жидкости | Срок ожидания, (кратность обработок) |
|------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 5 мл/4 л воды | Картофель | Колорадский жук | До 4 л/100 м ² | 20 (1) |
| | Капуста | Капустная моль, белянка, капустная совка | | 25 (1) |
| | Морковь | Морковная листоблошка | | 20 (1) |
| | Лук | Луковая муха | | 20 (2) |
| | Земляника | Малинно-земляничный долгоносик | | 30 (1) |
| 5 мл/10 л воды | Яблоня | Плодожорки, листовертки, пилильщики, цветоеды, медяницы | До 5 л/дерево | 30 (2) |
| 5 мл/5 л воды | Смородина, крыжовник | Тли | До 1 л/куст | 25 (1) |
| 5 мл/10 л воды | Декоративные деревья и кустарники | Тли, щитовки, листовертки, боярышница, пяденица, моли, пилильщики | До 5 л/растение | — (1) |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| | Цветочные культуры открытого грунта | Тли, трипсы, белокрылки, клопы, совка-гамма, капустная моль | 1–2 л/ 10 м ² | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|

Рекомендации по применению:

Налить в ведро 1 л воды, вскрыть ампулу или отмерить с помощью мерного стаканчика препарат в соответствии с таблицей, вылить в ведро с водой и перемешать, затем довести рабочий раствор до требуемого объема и снова перемешать.

Опрыскивать рано утром или вечером (после заход солнца) в сухую, безветренную погоду, равномерно смачивая листья, за 4-6 ч до дождя. Оптимальная температура при обработках от 12°C до 25°C.