

Стремительный рост

Микоризные грибы

«Стремительный рост» субстрат для повышения урожайности плодовых деревьев и кустарников, а также декоративности хвойных и лиственных деревьев, кустарников, многолетних растений. Применяется путем предпосадочной обработки корневой системы саженцев, луковиц, клубней, пролива уже высаженных растений на глубину залегания корней.

Состав: композиция штаммов арбускулярно-микоризных грибов (АМГ) рода *Glomus*, азотфиксирующих бактерий *Agrobacterium* sp. и *Brevibacillus parabrevis* и фосфатмобилизирующих бактерий *Pseudomonas* sp. на цеолите.

Хранить в упаковке изготовителя при температуре от 0 до +30 С°.

Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Срок хранения: 24 месяца.

Назначение:

- увеличивает обеспеченность растений азотом и фосфором
- способствует приживаемости саженцев
- повышает урожайность плодовых деревьев и кустарников без дополнительного использования удобрений
- улучшает качество ягод и фруктов
- улучшает внешний вид декоративных деревьев и кустарников, роз, многолетних цветов и растений, положительно влияет на прирост, кустистость, развитие корневой системы и продуктивность цветения
- повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды

Способ применения:

- Предпосадочная обработка клубней, луковиц, корневищ и т.п., обмакивание корневой системы многолетних растений, в том числе саженцев плодовых (на 30 мин): суспензия 2 ч.л./10 л;
- Закладка в лунку перед посадкой луковичных и клубневых: 2 ч.л./10 лунок;
- Закладка в лунку при посадке плодовых, ягодных и декоративных деревьев и кустарников, роз, многолетников: 0,5 ч.л./1 лунку;

- Пролив под корень растений (2-3 раза в вегетационный период) 0,25 л на небольшое растение, 1 л на кустарники, многолетники: суспензия 2 ч.л./10 л;
- Пролив плодовых и декоративных деревьев в предварительно приготовленные углубления в почве (20-30 см) в приствольном круге: суспензия 2 ч.л./10 л;
- Опрыскивания растений для повышения устойчивости к неблагоприятным условиям через 2-3 недели после появления всходов (листьев) перед цветением: суспензия 3 ч.л./10 л. Перед опрыскиванием добавить прилипатель.

Для приготовления суспензий используется бесхлорная вода комнатной температуры. Гранулы в воде НЕ РАСТВОРЯЮТСЯ. Суспензию настаивать в течение суток. После гранулы разбросать под растениями и заделать в почву рыхлением.