# РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ ПЕСТИЦИДА

# ГРИЗЛИ, Г (40 г/кг диазинона)

**Лицо, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида:**
АО Фирма «Август», Россия, ОГРН № 1025006038958
*Адрес юридического лица в пределах места нахождения:*
142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20А
Телефон/факс: +7(495) 787-08-00, 787-08-20,787-84-97 E-mail: corporate@avgust.com

**Изготовитель:** АО Фирма «Август» на филиале АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» (ВЗСП), Россия, ОГРН № 1025006038958
*Адрес юридического лица в пределах места нахождения:*
429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1.
Телефон/факс: +7(83537) 2-58-01; E-mail: vzsp@avgust.com

**Наименование пестицида:** ГРИЗЛИ

**Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой изготавливается пестицид:** ТУ 20.20.11-084-18015953-2019

**Действующее вещество, указанное в свидетельстве о государственной регистрации пестицида:** диазинон

**Концентрация:** 40 г/кг

**Препаративная форма:** гранулы (Г)

**Область применения пестицида:** для личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

**Назначение:** инсектицид для борьбы с медведкой.

**Совместимость с другими пестицидами:** в условиях ЛПХ не рекомендуется смешивать с другими препаратами.

**Период защитного действия:** не менее 14 суток.

**Селективность:** неселективен.

**Скорость воздействия:** высокая.

**Фитотоксичность:** нетоксичен для растений в рекомендуемых нормах расхода.

**Толерантность культур*:*** при соблюдении регламентов применения культурные растения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату.

**Возможность возникновения резистентности:** во избежание возникновения резистентности рекомендуется чередовать с инсектицидами иного механизма действия.

**Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:** запрещается транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами, лекарствами и кормами и применение в сельскохозяйственном производстве. Обработку проводить в отсутствие детей и животных.

**Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны:** учитывая специфику применения препарата (внесение гранул в почву), негативное воздействие на полезную энтомофауну практически исключено.
Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов.

**Класс опасности:** 3 класс опасности (умеренно опасное соединение).

**Первая помощь при отравлении:** *при первых признаках недомогания* следует немедленно прекратить работу, вывести пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять с

пострадавшего рабочую одежду и средства индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу; немедленно обратиться за медицинской помощью.
*При случайном проглатывании препарата* – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, «Энтерумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению, затем раздражением корня языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу.
*При вдыхании* - вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу* –промыть большим количеством проточной воды.
*При попадании в глаза* – немедленно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды.
После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью.
Информация для врача: антидоты – холинолитические препараты, реактиваторы холинэстеразы, атропин, амизил, тропацил. Применять их следует под наблюдением врача.

**Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления:** ФГУ «Научно–практический токсикологический центр ФМБА России», 129090, Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 3, к.7, тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68 -85

**Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении пестицида:**
На всех этапах обращения с пестицидом должны соблюдаться меры предосторожности согласно СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.
Транспортировка препарата осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
Запрещается работать с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов; принимать пищу, пить, курить во время работы.
Хранить препарат следует в плотно закрытой оригинальной заводской таре в нежилом вентилируемом помещении отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов в сухом месте, недоступном для детей и животных.

**Технология применения пестицида:** внесение гранул в почву. Культуры и регламенты применения приведены в таблице.

**Способы обезвреживания рассыпанного пестицида:** при россыпях препарата необходимо собрать его в сухие емкости и использовать по назначению. Загрязненный участок в помещении должен быть промыт водой с мылом или содой (200 г соды на ведро воды), участок земли должен быть перекопан.

**Методы уничтожения или утилизации пестицида:** остатки пестицида, пришедшего в негодность и (или) запрещенного к применению, подлежат термической утилизации или вывозу в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.

**Методы уничтожения тары из-под пестицида:** тара из-под пестицида подлежит термической утилизации или вывозу в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.

**Таблица с регламентами применения пестицида:**

| **Норма применения пестицида** | **Культура, обрабатываемый объект** | **Вредный объект** | **Способ, сроки, особенности применения пестицида** | **Срок ожидания (кратность обработок)** |
|---|---|---|---|---|
| 20 г/10 м$^2$ | Картофель (кроме раннеспелых сортов) | Медведка | Внесение в почву при высадке клубней на глубину 2-5 см | 60(1) |
| | Капуста (кроме раннеспелых сортов) | | Внесение в почву на глубину 2-5 см в период высадки рассады, при необходимости повторно через 10-14 дней | 60(2) |
| | Цветочные культуры | | Внесение в почву на глубину 2-5 см в период вегетации | -(2) |
| | Земляника (после сбора урожая) | | Внесение в почву на глубину 2-5 см после сбора урожая | |

Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения ручных работ – 7 дней.