# Комароед

От комаров, их личинок и других видов гнуса.

Применяется путем опрыскивания мест посадки и днёвки насекомых: стены подвалов, сараев, низкие кусты, прибрежная растительность, непроточные непитьевые водоемы, искусственные прудики.

Эффективно снижает популяцию различных видов гнуса.

Действующее вещество: 25% циперметрина.

**Меры безопасности:**

Не разрешается проводить обработку детям, беременным и кормящим женщинам.

Лицам с заболеваниями кожи и повышенной чувствительностью к химическим веществам применять средство с осторожностью.

Хранить препарат отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов для животных в сухом, прохладном месте, недоступном для детей и животных.

После работы со средством - вымыть руки водой с мылом, прополоскать рот водой.

Не допускать попадания средства в органы дыхания, рот, глаза, использовать средства индивидуальной защиты.

**Запрещается:**

Обрабатывать проточные водоёмы (ручьи), а также водоёмы, имеющие рыбохозяйственное значение или используемые для содержания рыб!

Пить, принимать пищу, курить во время обработки.

Обрабатывать источники питьевой и поливной воды, а также водоемы, которые могут быть использованы для купания!

Проводить обработку во время лёта пчел! Ограничение 96-120 часов.

**Способ применения:**

| Личинки комаров | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Обрабатываемый объект** | **Способ применения** | **Норма разведения** | **Норма расхода** | **Количество обработок** |
| Места выплода в водоёмах закрытого типа – искусственные прудики, противопожарные и другие ёмкости, вода в которых застаивается (не используется для полива и иных хозяйственных целей более 5-10 дней) | Опрыскать места выплода личинок | 1 мл/2,5 л воды | 10-30 мл на 1 м2 поверхности воды | Повторные обработки проводят при появлении личинок |
| Открытые непроточные естественные и искусственные водоёмы, в которых происходит выплод комаров (пруды, заболоченности, лужи, ямы-копанки на приусадебных, дачных и садовых участках, затопленные канавы вдоль дорог) | Опрыскать места выплода личинок | 1 мл/2,5 л воды | 100 мл/1 м2 поверхности воды | Повторные обработки проводят при появлении личинок |
| Комары | | | | |
| **Обрабатываемый объект** | **Способ применения** | **Норма разведения** | **Норма расхода** | **Количество обработок** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Места возможной посадки и днёвки насекомых: стены подвалов, сараев и прочих построек изнутри и снаружи в тенистых местах; рамы окон и дверей снаружи строений. Растительность (траву и низкие кустарники) вдоль заборов, около стен строений, а также прибрежную растительность непроточных водоёмов нерыбохозяйственного значения необходимо выкашивать, при невозможности выкашивания – обрабатывать водной эмульсией средства | Опрыскать места обитания окрылённых комаров | 1 мл/2,5 л воды | 50-100 мл/1 м2 в зависимости от численности комаров и типа обрабатываемой поверхности | Повторные обработки проводят при появлении комаров |