Максим Дачник

Применяется для протравливания посадочного материала от почвенной инфекции: лука и чеснока от гнилей, семенного картофеля от парши и ризоктониоза, гороха от фузариоза, гнилей, плесневения семян, луковиц, клубней, корневищ цветов от фузариоза и гнилей. А также для лечения цветочных культур и предотвращения заражения рассады почвенными инфекциями. Сохраняет дорогой посадочный материал. Предупреждает распространение болезней в хранилище. Укрепляет иммунитет растений.

Состав: 25 г/л флудиоксонила.

Благодаря защитно-контактному действию антибиотика, дезинфицирует луковицы, клубни, корневища, почву. Создает защитный барьер на поверхности посадочного материала и в прикорневой зоне в почве. Защищает растения весь период хранения и роста. Обладает эффективным действием против микроорганизмов, устойчивых к другим фунгицидам.

Способ применения
Замачивать посадочный материал в течение 30 минут или опрыскивать: перед посадкой, перед закладкой на хранение, поливать почву под корень больного растения, после посева семян и высадки рассады.

Обрабатываемая культура	Вредитель/заболевание	Способ, время обработки, особенности применения	Норма применения препарата	Расход рабочей жидкости	Срок ожидания (кратность обработок)
Картофель семенной	Ризоктониоз, фузариоз	Опрыскивание клубней перед посадкой	4 мл/100 мл воды	100 мл/10 кг	– (1)
	Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, альтернариоз, антракноз, серебристая парша, мокрая гниль	Опрыскивание клубней перед закладкой на хранение и последующим просушиванием	2 мл/100 мл воды	100 мл/10 кг	– (1)
Горох на зерно	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, серая гниль, плесеневение семян	Обработка семян перед посевом путем замачивания в суспензии препарата с экспозицией 30 мин и последующим просушиванием	2 мл/300-500 мл воды	300-500 мл/1 кг	– (1)

Лук всех генераций	Шейковая гниль, гниль донца, черная плесневидная гниль, пенициллезная гниль	Обработка посадочного материала путем погружения в 0,2%-ную суспензию препарата с экспозицией 30 мин и последующим просушиванием	2 мл/л воды	1 л мл/1 кг	20(1)
Чеснок яровой и озимый (посадочный материал)	Гниль донца, черная плесневидная гниль, серая гниль, пенициллезная гниль	Обработка перед посадкой и закладкой на хранение путем погружения в 0,2%-ную суспензию препарата с экспозицией 30 мин и последующим просушиванием	2 мл/л воды	1 л мл/1 кг	– (1)
Цветочные культуры (посадочный материал)	Гельминтоспориоз, фузариоз, пенициллез, ризоктониоз, серая гниль	Обработка посадочного материала перед посадкой и закладкой на хранение путем погружения в 0,2%-ныйй рабочий раствор экспозицией 30 мин и последующим просушиванием	2 мл/л воды	1 л мл/1 кг	– (1)
Цветочные растения	Корневые гнили, фузариозное увядание, вертициллезное увядание	Полив почвы под корень больного растения	2 мл/л воды	50-100 мл/растение	– (1-2)
Сеянцы и рассада цветочных растений	Корневые гнили	Полив почвы после посева семян и высадки рассады	1 мл/л	4 л/кв.м (1 л на 5 пог.м)	– (1-2)

Совместимость

Допускается совмещение с бактериальными фунгицидами (Фитоспарин, Алирин-Б, Гамаир) с применением половинной нормы препарата Максим Дачник при полной норме биологических препаратов.

Меры безопасности

Во время работы с веществом нужно придерживаться стандартных мер:

- надеть плотную одежду, перчатки и маску;
- не принимать пищу, не пить и не курить;
- после обработки грядок вымыть руки и лицо с мылом;
- утилизировать упаковку от фунгицида.

Хранить препарат 3 года с момента изготовления при температуре от 0°С до 35°С в местах, недоступных детям и домашним животным.

Изготовитель препарата компания Сингента (Швейцария)

Изготовитель фасовки Фирма “Зеленая Аптека Садовода”