

Регламент применения

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице.

Объем приготовленного рабочего раствора должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованных растворов.

Ручной или ранцевый опрыскиватель на 1/3 заполнить водой, добавить необходимую дозу препарата (1 пакет на 3 литра воды), долить оставшееся количество воды и весь объём тщательно перемешать.

Культура	Норма расхода препарата	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения.	Сроки ожидания (кратность обработок)
Картофель	85 г на 10 л	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 3 л на 100 м ² .	20(3)
Чеснок озимый, лук репчатый	65-85 г на 10 л	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка - профилактическая, последующие - при появлении первых признаков болезни с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 3 л на 100 м ² .	20(3)
Смородина чёрная	100 г на 10 л	Септориоз	Опрыскивание в период бутонизации. Расход рабочей жидкости - 1-1,5 л на куст	20(1)

Сроки выхода для проведения ручных работ – 7 дней.