Фунгицид Ридомил Голд ВДГ — двойная надежность, проверенная временем!

Системно контактный комбинированный фунгицид для защиты картофеля, овощных культур и винограда от комплекса болезней. Защищает картофель и томаты от фитофтороза и альтернариоза, огурцы и лук — от пероноспороза, виноград — от милдью.

- Здоровые растения даже в условиях высокого риска развития болезни
- Максимальный контроль инфекции в период активного роста и развития культуры
- Длительная защита полностью всего растения, включая необработанные части — новый прирост листа, точку роста, стебель, клубни картофеля, плоды томата
- Здоровый, не поврежденный фитофторозом и пероноспорозом урожай картофеля и овощных культур

Всегда проводите профилактические обработки фунгицидом, то есть до появления симптомов заболевания!

Способ обработки:

Опрыскивание в период вегетации. Первая обработка — профилактическая при наступлении погодных условий благоприятных для развития болезней, но не позднее смыкания ботвы в рядах.

Последующие с интервалом 10—14 дней, максимальная кратность обработок — 3.

Для всех культур: сроки выхода на ручные работы - 7 дней. Последняя обработка не менее чем за 20 дней до уборки урожая.

Средняя норма расход препарата: 10 г на 2 л воды.

Норма расхода рабочей жидкости: 2 л на 40 м2 (5 л на сотку), при этом норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для полного смачивания всей листовой поверхности.

Опрыскивание проводится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду, не допуская сноса препарата на соседние культуры. Применяйте препарат РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ профилактически (до появления на растениях внешних признаков болезни).

Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной поверхности. РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ не смывается дождем после полного высыхания обработанной поверхности.

Особенности:

- Не используйте препарат для лечебных и искореняющих опрыскиваний

- При переходе к обработке контактным или трансламинарным фунгицидом используйте интервал между обработками, рекомендованный для данного контактного или трансламинарного фунгицида
- РИДОМИЛ ГОЛД МЦ эффективно подавляет патогены из класса Оомицеты (возбудителей фитофтороза, ложных мучнистых рос) и имеет дополнительный эффект против грибов родов Alternaria, Gloeosporium, Cladosporium и др.

Хранение препарата: хранить препарат в сухом темном помещении при температуре от -10°С до +35°С. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке — 3 года.

Внимание! При первых признаках отравления (тошнота, учащенное дыхание, общая слабость, головокружение) необходимо вывести пострадавшего из зоны загрязнения, снять спецодежду, обеспечить доступ свежего воздуха. При попадании на кожу или в глаза — обильно промыть чистой проточной водой. При случайном попадании внутрь — выпить несколько стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на 1 кг массы тела, вызвать рвоту, повторить это несколько раз. При вдыхании — вывести на свежий воздух. Специфические антидоты отсутствуют. Лечение симптоматическое.