

Фунгилекс

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА

Фунгилекс - биологический препарат для защиты растений от болезней. Применяется для защиты сельскохозяйственных культур от корневой гнили, серой и белой гнилей на овощных культурах открытого и защищенного грунта, ризоктониоза и альтернариоза картофеля, черной ножки капусты, корневых гнилей злаков, антракнозного и фузариозного увядания льна и др.

Основа - штамм гриба-антагониста *Trichoderma* sp. D-11, титр спор – не менее 1 млрд/мл.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Жидкость (суспензия) с *Trichoderma* sp. D-11

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Для приготовления рабочей жидкости рассчитанное количество препарата размешивают в небольшом количестве воды, затем добавляют в воду до необходимого объема. Рабочую жидкость препарата биологического Фунгилекс готовят непосредственно перед обработкой.

Культура	Вредный организм	Норма расхода, л/га, л/т	Способ, время обработки, ограничения	Максимальная кратность обработок
Зеленые культуры (проточная гидропоника)	Корневая гниль	100 мл препарата на 10 кг торфосубстрата 1 мл препарата/50 мл воды/горшочек	Последовательные обработки: - внесение препарата в торфосубстрат перед посевом семян - полив рабочей жидкостью препарата непосредственно перед выставлением растений на линию	1 1
Огурец защищенного грунта	Корневая гниль	1 мл/100 мл	Последовательные обработки: - полив растений после высадки в теплицу; - повторный полив через 14-20 дней; - полив растений через 30-40 дней	3
Овес (кроме семенных посевов)	Корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	2,5	Предпосевная обработка. Норма расхода рабочей жидкости – 10 л/т	1

Гарантийный срок хранения: 3 месяца

Фунгилекс хранят в сухом, вентилируемом помещении в закрытой таре при температуре +4⁰С до +20⁰С.

Для возможности совместного использования Фунгилекса с пестицидами химического синтеза и биопрепаратами необходима предварительная оценка совместимости к конкретному средству защиты растений. Известен положительный эффект совместного применения Фунгилекса и ПрофибактTM-Фито. Фунгилекс совместим с минеральными удобрениями. При соблюдении регламентов применения Фунгилекс не фитотоксичен. Отрицательное последствие на последующие культуры отсутствует.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Токсичность: IV класс опасности, «аллерген».

При применении препарата отрицательного действия на полезные объекты флоры и фауны не выявлено. При работе с препаратом биологическим Фунгилекс необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, очки, спецодежду. На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. Загрязненную спецодежду замачивают моющим средством (1 л на 10 л воды) или кашицей хлорной извести (1 кг на 4 л воды) с дальнейшим ополаскиванием водой. После работы следует принять душ или тщательно вымыться с мылом.

Производится в соответствии с ТУ РБ 600052677.009-2013