ПРЕПАРАТ «*MELOBASS*»,

пс, титр 6 млрд. спор/г(*Beauveria bassiana* (Bals) Vuill., шт.10-06)

Препаративная форма: ***паста серо-коричневого цвета***

Назначение: ***биоинсектицид***

Токсичность: 4 класс опасности – **малоопасное вещество**

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода препарата	Вредный организм	Способ, время обработки ограничения
Подвои, саженцы плодовых культур	**20 кг на 120 л «болтушки»**	**Личинки майских хрущей**	**Обработка корневой системы растений в составе «болтушки» из земляной смеси непосредственно перед посадкой**
Картофель	**3 кг**	**Колорадский жук (личинки 1-2 возраста)**	**Опрыскивание в период массового появления личинок. 2 обработки с интервалом 6-8 дней. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га.**
Огурец закрытого грунта	20 кг	**Личинки сциарид, бабочниц и береговушек**	**Полив 1,5%-ной рабочей жидкостью(50 мл/растение после полива водой) с интервалом 14-21 день в период массового лета имаго каждого поколения**

Порядок приготовления рабочей суспензии: ***Рабочую жидкость готовят не более, чем за 2 часа до обработки.***

Личинки майских хрущей. ***«Болтушку» готовят в специальной емкости. В зависимости от площади обработки загружают в емкость препарат, доливают воду из расчета 5 л на 1 кг препарата, добавляют землю, затем все тщательно перемешивают до получения однородной массы.***

Колорадский жук. ***Препарат используют методом опрыскивания растений. Для приготовления рабочей жидкости 3 кг препарата тщательно размешивают в 10 л воды до получения однородной суспензии. Затем на сите опрыскивателя процеживают и добавляют воду до 300-400 л.***

Личинки сциарид, бабочниц и береговушек. ***Препарат используют методом полива. Для приготовления рабочей жидкости 20 кг препарата тщательно размешивают в 100 л воды до получения однородной суспензии, а затем добавляют воду до 1300 л рабочей жидкости. Под каждое растение огурца в зону корневой шейки вносят 50 мл полученной жидкости.***

Период защитного действия: **в течение вегетационного сезона.**

Скорость воздействия: ***Скорость воздействия препарата зависит от температуры и влажности: при температуре +18° С и влажности выше 50% первые признаки поражения насекомых отмечаются на 5 сутки.***

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: ***Препарат безвреден для теплокровных и полезных насекомых. Применение препарата не приводит к санитарно-опасным загрязнениям почвы, растений, воздушной среды и сточных вод.***

Меры предосторожности при работе с пестицидами, транспортировке и хранении: ***Микробный препарат «MELOBASS» не обладает вирулентными, токсигенными и токсическими свойствами. Препарат может индуцировать слабую сенсибилизацию по смешанному типу гиперчувствительности***.

При работе с препаратом «MELOBASS» необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, очки, спецодежду.

Срок годности: ***12 месяцев от даты изготовления препарата.***

Условия хранения: *Препарат хранят в закрытой таре в помещении, защищенном от атмосферных осадков, при температуре от 0 до +12°С.*