

АНТИТЛЯ И БЕЛОКРЫЛКА (Имидор, ВРК)

200 г/л имидаклоприда

Для любой погоды. От любых вредителей.

Для чего и где применять: Для цветочных растений от тли и белокрылки

Препарат системного действия против тли, белокрылки и остальных вредителей на цветочных растениях.

Преимущества

- Уничтожает тлю, белокрылку и остальных вредителей за 24 часа!
- Обеспечивает результат на длительное время, не вызывает привыкание у насекомых
- Прекрасно работает в жару, устойчив к смыванию водой

Действие

Препарат проникает в листья растения и быстро распространяется по нему, защищая цветочные культуры на долгое время от вредителей.

Результат



Уничтожает тлю, белокрылку и остальных вредителей за 24 часа!



Обеспечивает результат на длительное время, не вызывает привыкание у насекомых



Прекрасно работает в жару, устойчив к смыванию водой

Рекомендации по применению

Рекомендованное количество препарата развести сначала в небольшом количестве воды, а затем долить воду до требуемого объёма. Обработку проводить в вечерние часы в безветренную

погоду. Это требование применительно практически ко всем инсектицидам.

Полезно знать:

Насекомые (тли, трипсы, белокрылки, цикадки) на первых порах наносят незаметные для глаза повреждения – делают проколы в побегах и высасывают сок. Однако по мере размножения вредителей ущерб для культуры становится все более очевидным – деформируются и скручиваются листья и стебли, на листьях появляются желтые пятна, не раскрываются и опадают бутоны. Внешний вид цветочных растений уже не радует глаз. Чтобы не допустить этого, провести обработку лучше при появлении первых вредителей. Мониторинг будет состоять в регулярном осмотре нижней стороны листьев и их пазух, бутонов и стеблей в верхней части, а также встряхивании растений.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

3 класс опасности (умеренно опасное)

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ

апрель - август

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

от -10 до +30

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

Регламент применения

Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице:

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата	Способ, время обработки,
-----------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

			особенности применения
Цветочные и горшечные растения (кроме комнатных)	Тли, цикадки, трипсы, белокрылка	1-5 мл /10 л воды / 100 м ²	Опрыскивание в период вегетации

Сроки выхода для проведения ручных работ – 3 дня.

Объем приготовленного рабочего раствора с целью исключения его возможных остатков должен соответствовать предполагаемому объему работ.

Ручной или ранцевый опрыскиватель на 1/3 заполнить водой, залить полную дозу препарата, долить оставшееся количество воды и все тщательно перемешать.

