КИНФОС

300 г/л диметоата + 40 г/л бета-циперметрина

Для чего и где применять: защита от листогрызущих вредителей.

Преимущества

- Высокая скорость воздействия и защита до 14 дней
- Уничтожает личинок и взрослых особей
- Действует на насекомых с приобретенной устойчивостью

Действие

В состав препарата входят 2 действующих вещества, они гарантируют полное уничтожение вредителей на яблоне и не вызывают привыкания. Препарат блокирует нервные импульсы у насекомого, что вызывает быструю гибель

Результат

Высокая скорость воздействия и защита до 14 дней

Уничтожает личинок и взрослых особей

Действует на насекомых с приобретенной устойчивостью

Рекомендации по применению

Рекомендованное количество препарата развести сначала в небольшом количестве воды, а затем долить воду до требуемого объёма. Обработку проводить в вечерние часы в безветренную погоду. Опрыскивать в период вегетации.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ

3 класс опасности (умеренно опасное).

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ

апрель-июль

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

от -10 до +25

СРОК ГОДНОСТИ

3 года

Регламент применения

Как применять

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице.

Объем приготовленного рабочего раствора должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованных растворов.

Ручной или ранцевый опрыскиватель на 1/3 заполнить водой, залить полную дозу препарата, долить оставшееся количество воды и весь объём тщательно перемешать.

Культура	Норма расхода препарата	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения.	Сроки ожидания (кратность обработок)
Яблоня	2-4 мл на 10 л воды	Яблонный цветоед, яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости от 1 - 5 л на дерево (в зависимости от размера кроны)	40(1)